

## Protocollo per la risemina della microfauna in un acquario marino

Al momento della ricezione, distribuisci il contenuto del flacone di **Microfauna meiofauna viva** in due giorni consecutivi (ad esempio, 50% la prima sera e 50% la seconda sera), preferibilmente la sera quando i pesci sono meno attivi, spegnendo lo schiumatoio per un periodo che può variare da un'ora fino a tutta la notte.

Spegni lo schiumatoio per tutta la notte solo se hai già testato questa pratica in precedenza senza riscontrare problemi.

Per quanto riguarda i flaconi di **Microfauna Booster**<sup>®</sup> e **Zoo Booster**<sup>®</sup>, segui il dosaggio riportato qui di seguito per un periodo di 1 mese :

10 ml per ogni 100 litri d'acqua, da 2 a 3 volte a settimana, con lo schiumatoio spento per un tempo che varia da 1 ora fino a tutta la notte. Si consiglia di somministrare preferibilmente la sera o al mattino presto. Agitare bene prima dell'uso.

## Consiglio dell'esperto:

- Somministra **Bactoreef®** ogni mattina, alla dose di 1 ml per ogni 100 litri d'acqua.
- **Coral Booster**® è un eccellente promotore della crescita della microfauna, da utilizzare per brevi periodi al fine di ottenere risultati ottimali, disponibile in formato ridotto (60 ml).

Conserva i flaconi del kit di risemina in frigorifero e agitare prima dell'uso (tranne il flacone di Microfauna Meiobentonica Viva, che può essere utilizzato direttamente).

**Bactoreef** si conserva a temperatura ambiente, preferibilmente in un luogo asciutto e al riparo dalla luce.